


# Adato.

Medeltidig matpotatis med relativt stora knölar och ganska högt torrsubstanshalt.

- Oval-långa knölar med grunda ögon, ljusgult skal och ljusgult till krämfärgat köttfärg
- Mjölig kokegenskap med bra konsumtionsegenskaper
- Resistent mot PCN (RO 1&4) och potatiskräfta (1) och bra motstånd mot Fusarium



## Egenskaper

### Ändamål

### Matpotatis

### Växtegenskaper

Mognad  
Inledande utveckling  
Blomfärg

medeltidig matpotatis  
mycket bra  
vit

### Knölegenskaper

Skalfärg  
Köttfärg  
Knölform  
Knölsättning  
Knölstorlek  
Regelbundenhet av storlek  
Ögondjup  
Torr substans (TS)  
Specifika vikten, mogen  
Kokegenskap  
Skördeskador  
Stötblått  
Groningsvila

gult  
ljusgult  
oval-lång  
bra  
medel  
regelbunden  
mycket grunda  
20,1%  
1,079  
BC  
något känslig  
ganska känslig  
medel

### Motståndskraft

Gul nematod RO 1 och 4  
Gul nematod RO 2 och 3  
Vit nematod PA 2  
Vit nematod PA 3  
Y<sup>n</sup>-virus  
Y<sup>ntn</sup>-virus  
Vanlig skorv  
Pulverskorv  
Brunröta  
Bladmögel  
Rostringar  
Potatiskräfta 1  
Sencor (Metribuzin)

immun  
mottaglig  
mottaglig  
mottaglig  
ganska motståndskraftig (7)  
något mottaglig  
något mottaglig  
ganska mottaglig  
ganska motståndskraftig (7)  
ganska mottaglig  
mottaglig  
Immun  
inte känslig



### Agrico Nordic AB

Kompanigatan 1, 553 05 Jönköping / Sweden

T +46 (0)36 372 040 / [E info@agriconordic.com](mailto:info@agriconordic.com)

[I www.agriconordic.com](http://www.agriconordic.com)

## Odlings förberedelser



### Växtnäring

Kväve N: 140-160 kg/ha: sandjord +10 kg/ha.  
Rekommenderas delad giva och den andra givan appliceras vid knölbildningen.

Fosfor P: standardgiva

Kalium K: 275 kg/ha: Sandjord +25 kg/ha

Gödslingsnivån baseras på odling i södra Sverige och på jordanalys.

### Utsädesbehandling

Plantera Adato i varmjord (10° C).

### Planteringsavstånd

Radavs. 75 cm: Knölstorlek 35-50: sättavstånd 25 cm

Radavs. 85 cm: Knölstorlek 35-50: sättavstånd 23 cm

## Odling

### Ogräs

Användning av Sencor (metribuzin) ger inga problem.

### Svampmedel (fungicider)

Strikt förebyggande besprutningsschema mot bladmögel är nödvändigt, eftersom Adato är ganska mottaglig.



## Skörd & Lagring



### Skörd

Skörd två veckor efter väl genomförd blastdödning är vanligtvis tillräckligt, eftersom Adato ganska känslig mot stötblått men bara lite känslig mot skördeskador.

### Lagring

Adato har medellång lagringsvila (6 månader).

Say  
potato,  
say

