

# Jacky.

Tidig småfallande matpotatissort för ekologisk- och konventionell odling. hög skörd och bladmögelresistens. Lämplig till kul- och mat-marknaden samt för skalning.

- Rundovala knölar med gult skal och ljusgul köttfärg.
- Fastkokande sort med hög torrsubstanshalt, bra kok- och friteringsegenskaper.
- Bladmögelresistens i växten och brunrötaresistens i knölen, inte känslig för skördeskador.



## Egenskaper

### Ändamål

### Matpotatis Ekologisk

### Växtegenskaper

Mognad	medeltidig matpotatis
Inledande utveckling	bra
Blomfärg	ljusviolett

### Knölegenskaper

Skalfärg	gul
Köttfärg	ljusgul
Knölform	rundoval
Knölsättning	mycket hög
Knölstorlek	liten
Regelbundenhet av storlek	regelbunden
Ögondjup	mycket grunda
Torr substans (TS)	20,2%
Specifika vikten, mogen	1,079
Kokegenskap	B
Skördeskador	inte känslig
Stötblått	inte känslig
Groningsvila	medellång

### Motståndskraft

Gul nematod RO 1 och 4	mottaglig
Gul nematod RO 2 och 3	mottaglig
Vit nematod PA 2	mottaglig
Vit nematod PA 3	mottaglig
Y <sup>n</sup> -virus	mottaglig
Y <sup>ntn</sup> -virus	motståndskraftig (8)
Vanlig skorv	mottaglig
Pulverskorv	-
Brunröta	immun (9)
Bladmögel	immun (9)
Rostringar	något mottaglig
Potatiskräfta 1	-
Sencor (Metribuzin)	inte känslig



### Agrico Nordic AB

Kompanigatan 1-2, 553 05 Jönköping / Sweden

T +46 (0)36 372 040 / [E info@agrimonordic.com](mailto:info@agrimonordic.com)

[I www.agrimonordic.com](http://www.agrimonordic.com)

## Odlings förberedelser



### Växtnäring

Kväve N: 120–140 kg/ha: sandjord +10 kg/ha.

Fosfor P: standardgiva

Kalium K: 250 kg/ha: sandjord +25 kg/ha

Gödslingsnivån baseras på odling i södra Sverige och på jordanalys.

Vid tillförsel av organiskt gödselmedel rekommenderas att kvävegivan inte är högre än att den tar slut vid blastdödning (dvs. blasten börja gulna) för att uppnå rätt torrsubstanshalt.

### Utsädesbehandling

Avgroddning kan ha negativ inverkan på avkastning och storleksfördelningens jämnhet. Plantera i varm jord (10° C).

### Planteringsavstånd

Radavs. 75 cm: knölstorlek 35–50: sättavstånd 23 cm

Radavs. 85 cm: knölstorlek 35–50: sättavstånd 21 cm

## Odling

**Jacky** är mottaglig för vanlig skorv. Jämn markfukt är av betydelse. Därför är det viktigt vid behov att första bevattningen genomförs tidigt redan i knölbildningsstadiet när stolonerna är som "virknålar" och börjar svälla. En något djupare sättning medför att det är lättare att hålla markfukten i den miljö där knölna anläggs vilket innebär något under utjämnad markyta. I bäddodling är sättdjupet lite grundare.

### Ogräs

Användning av Sencor (metribuzin) ger inga problem.

### Svampmedel (fungicider)

Jacky är immun mot bladmögel och brunröta. I konventionell odling rekommenderas förebyggande 2–3 bladmögelbekämpningar under odlingen och en vid blastdödning.



## Skörd & Lagring



### Skörd

För att bibehålla uppnådd torrsubstanshalt rekommenderas snabb blastdödning till exempel gasolbränning.

Skörd två veckor efter väl genomförd blastdödning är vanligtvis tillräckligt, eftersom Jacky inte är känslig mot stötblått och skördeskador.

### Lagring

Jacky har medellång lagringsvila och är lämplig för medellång lagring vid 4–5° C.

Say  
potato,  
say

